

Flemmingstraße 2, 09116 Chemnitz
Tel. (0371) 333 33403
Fax (0371) 333 33440

Abt. Mikrobiologie
Tel. (0371) 333 34536
Fax (0371) 333 34541

Laboretikett

Einsender: Kr.-haus, MVZ, Praxis
ggf. Fachabteilung, Station

Patienten-Etikett. Sonst unbedingt ausfüllen und markieren!

Name,
Vorname

Straße

PLZ/Wohnort

Kostenträger

Geb.-Datum

Fallnummer

männlich ☐

weiblich ☐

divers ☐

Station

Behandlungs-Art
Abrechnung

☐ stationär

☐ teilstationär

☐ vorstationär

☐ nachstationär

☐ ambulant

☐ ambul. OP

☐ Begutacht.

☐ privat

☐ Kassen (PK-EK)

☐ fremd. Einr.tg.

☐ Berufsgen.sch.

Abnahme

Tag

Monat

Zeit

Unterschrift · Namensstempel
verantwortl. Arzt

1. Was hat der Patient?

Klinische Hinweise: z.B. Symptome, Diagnosen, Reisen, Vorbefunde, Antibiotika, Tiere, ...

- ☐ Diabetischer Fuß
- ☐ Dekubitus
- ☐ Ulcus cruris
- ☐ Abszess
- ☐ Endokarditis

2. Was schicken Sie ins Labor?

Frei formulieren und / oder unten ankreuzen

☐ Biopsie

Abnahmeort:

☐ Punktat / Flüssigkeit

☐ in BK-Flasche

Abstrichtupfer

☐ einfacher Abstrich
(keine anaerobe Kultur)

☐ tiefer Wundabstrich

☐ intraoperativer Abstrich

☐ aus Drainage

☐ von Gelenkendoprothese

Urin

☐ aus Mittelstrahl

☐ aus Dauerkatheter

☐ aus Einmalkatheter

☐ anderer Urin:

Atemwegssekret

☐ Sputum

☐ induziertes Sputum

☐ Trachealsekret (per Sonde)

☐ Bronchialsekret (Bronchoskop)

☐ BAL

Blut

☐ aerob/anaerobe Blutkultur

☐ nur aerobe Blutkultur

Fremdmaterial / Device

☐ ZVK-Spitze: ☐ anderer Device:

Liquor

☐ lumbal, nativ

☐ lumbal, in BK-Flasche

☐ anderer Liquor:

Anderes

☐ Tonsillen-, Rachenabstrich

☐ Vaginalabstrich

☐ Portioabstrich

☐ Zervixabstrich

☐ Magensaft

☐ Aszites

☐ Pleurapunktat

3. Welche Untersuchung(en) wünschen Sie?

Frei formulieren und / oder unten ankreuzen

Standard

☐ Erreger / Resistenz

☐ mit Mikroskopie

☐ Mikroskopie cito

Telefon:

Besondere kulturelle Untersuchung

☐ Anaerobier

☐ Aktinomyzeten

☐ Gonokokken

☐ Nokardien

☐ Schimmelpilze

☐ Dermatophyten

Tuberkulose / Mykobakteriose

☐ Mikroskopie / Kultur

☐ MTK-PCR

☐ MTK-IGRA (Quantiferon-TB, 5 ml Li-Hep.)

☐ Mikroskopie cito

Telefon:

Screening

☐ MRSA

☐ VRE

☐ MRGN

☐ ÜWK

☐ B-Streptokokken

☐ Cand. auris

Weitere direkte Erregernachweise

☐ Legionellen (Urin!)

☐ Kryptokokken (Serum, Liquor!)

Stuhluntersuchungen

☐ Clostridium difficile

☐ Salmonella, Shigella, Yersinia
und Campylobacter (TPE)

☐ Adenovirus Ag

☐ Rotavirus Ag

☐ Norovirus Ag

☐ EHEC

☐ Wurmeiersuche

☐ Amöben Ag

☐ Kryptosporidien Ag

☐ Lamblien Ag

☐ Helicobacter Ag

Besonderheiten mikrobiologischer Probengewinnung:

Biopsien und Punktate sind immer besser geeignet als Abstrichtupfer.

Eine mikroskopische Untersuchung erfolgt nur aus Biopsien und Punktaten bzw. Flüssigkeiten.

Transport in sterilen Probengefäßen, evtl. mit Zusatz von wenig sterilem NaCl 0,9% zum Schutz vor Austrocknung.

Tuberkulosedagnostik: In der Regel 3 Proben, Abstrichtupfer sind nicht geeignet, PCR nur zusätzlich zur Kultur möglich.

Bei der Standarduntersuchung „Erreger und Resistenz“ werden sowohl Pilze, als auch multiresistente Erreger erfasst.

Urin: Bei Transportverzögerung gekühlt zwischenlagern.